

PRI KRONIČNI VNETNI ČREVESNI BOLEZNI IN KRONOVI BOLEZNI

Pri tem obolenju je potrebno najprej ugotoviti ali je bolnik občutljiv na prepeličja jajca, in v 70% primerov ni preobčutljivosti, se lahko začne s terapijo uvajanja, ki je navedena v tabeli. Po končanem uvajanju pa je potrebno uživati po 3 prepeličja jajca na dan 90dni. Nato imam bolnik 30 dni pavze in terapijo ponavlja. Če se stanje zaradi pavze poslabša, mora bolnik prej pričeti z novim ciklusom terapije!

Test alergija ali preobčutljivosti na prepeličja jajca naredite tako, da 2 dni zaporedno pojedete po 3 jajčka in opazujete odziv telesa. Iščete znake alergije ali pa prebavne motnje. Če znakov ni, potem pričnite s terapijo, če pa so znaki nejasni pa test ponovite čez 7 dni. Če tudi po tem znaki niso jasni, začnite s uvajalno terapijo in pazite na znake, kot ob testu!

Tabela

DAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Št. jajc	1	0	1	0	1	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	4	0	4	0