

UPORABA PREPELIČJIH JAJC PRI TEŽAVAH S KOLITISI OSTALIMI ČREVESNIMI OBOLENJI

Pri težavah s črevesjem, dosežemo fantastične učinke, če terapije opravljamo dovolj zgodaj. Za uživanje jajc ob prebavnih težavah in težavah črevesja, je pomembno spremljanje učinka. Če po 14 dneh terapije ni nikakršnih znakov izboljšanja, potem je potrebno terapijo prekiniti. V črevesju prehaja hrana v kri, kar pomeni, da obolenja črevesja pomenijo za človeka bistveni problem prehranjevanja! S prepeličjimi jajci dosežemo učinke delovanja encimov, kot biokatalizatorjev, kar pomeni, snovi iz jajca pomagajo pri uravnoveženem prebavljanju hrane. Ker jajca vsebujejo folno kislino se krepijo tudi žile prebavnega trakta, kjer poteka resorpcija hrane iz črevesja.

Terapije lahko delamo:

PO OPERACIJAH NA ČREVESJU.

Po operacijah na črevesju, je pomembno, da bolnik dobi Terapijo z prepeličjimi jajci pravočasno, ne prezgodaj po operaciji, ne prej kot po treh tednih. Pomembno je tudi, da za dober učinek in pravilno vzpostavitev prebave ne začnemo kasneje, kot po 8 tednih. Vsak zamujen teden prinese manjši terapevtski učinek! Potrebno je uvajanje, ki je prikazano v tabeli. Po uvajanju sledi še 30 dni terapije s 5 jajci na dan in nato 30 dni pavze, ter na to nova 30 dnevna terapija brez uvajanja.

Tabela

DAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Število zaužitih jajc	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5